

MoviGo® Duo

Kant-en-klare drank in zakjes

MEDISCH HULPMIDDEL

Voor de effectieve en milde behandeling en verlichting van obstipatie, wanneer dit gepaard gaat met winderigheid en een opgeblazen gevoel.

1. Wat is het product en waarvoor wordt het gebruikt

MoviGo Duo is een medisch hulpmiddel dat ontworpen is om obstipatie of moeilijk te passeren ontlasting te helpen verlichten, wanneer het gepaard gaat met winderigheid en een opgeblazen gevoel.

MoviGo Duo bevat macrogol 4000 voor de behandeling van constipatie en simeticon voor het verlichten van een opgeblazen gevoel. Macrogol 4000 verzacht de ontlasting door water aan te trekken in de darmen. Dit helpt de ontlasting te hydrateren en gemakkelijker te laten passeren, waardoor de stoelgang comfortabeler en regelmatig verloopt, doorgaans zonder dat er een plotselinge of dringende noodzaak is om het toilet te gebruiken'. Macrogol 4000 wordt niet door het lichaam opgenomen. Het reist door het spijsverteringsstelsel en wordt moeiteloos met de ontlasting uitgescheiden.

Simeticon breekt ingesloten gasbellen af om het gas in de maag en de darm dat met constipatie gepaard gaat, te verwijderen.

1.1 Samenstelling

Elk zakje bevat:

10 g macrogol 4000, 100 mg simeticon

Hulpstoffen: water, sucralose, sinaasappelaroma's, plantaardige glycerine, polysorbaat 80, sucrose-esters, kaliumsorbaat.

2. Dosering en duur van de behandeling

De aanbevolen dosering is:

- kinderen van 1 tot 6 jaar: 1 zakje per dag.
- volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 2 zakjes per dag.

Drink het product rechtstreeks uit het zakje of verdun het met water, indien nodig. Het is raadzaam om het product tussen de maaltijden in te nemen.

Voor patiënten met een nierfunctiestoornis is het niet nodig de dosering aan te passen.

De duur van de behandeling is gewoonlijk 2 weken. Bij refractaire of chronische obstipatie kan echter een herhaalde of langdurige behandeling nodig zijn. Zo een obstipatie kan veroorzaakt worden door geneesmiddelen zoals pijnstillers (opioiden), of geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (anticholinergica). Ziekten zoals multiple sclerose of de ziekte van Parkinson kunnen refractaire obstipatie veroorzaken.

Gebruik dit product in ieder geval niet langer dan

30 opeenvolgende dagen zonder uw arts te raadplegen.

3. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij intolerantie voor het product of bij bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen of polyethyleenglycol.

Gebruik dit product niet bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Gebruik dit product niet als u lijdt aan:

- darmstenose
- darmperforatie
- inflammatoire darmziekte (zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa).

Niet innemen bij darmobstructie.

4. Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van dit product tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding. Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit product inneemt.

5. Mogelijke bijwerkingen

Het wordt aanbevolen om de voorgestelde dosering niet te overschrijden, aangezien hogere doseringen onverwachte bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Maag- en darmklachten zoals darmgerommel, buikpijn, misselijkheid en milde diarree (vooral in het begin) kunnen voorkomen. Als de bijwerkingen binnen enkele dagen verergeren of niet verdwijnen, of als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan, licht dan uw arts in.

In zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties (huiduitslag en netelroos) optreden. Als u deze bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van het product en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

6. Interacties met voedingssupplementen en geneesmiddelen

Dit product zou de biologische beschikbaarheid van andere geneesmiddelen kunnen wijzigen als ze tegelijkertijd worden ingenomen. Met name de osmotische kracht van macrogol en de verandering in de maag-darmtransit kunnen hun effectiviteit negatief beïnvloeden.

Het is dus aangewezen dat de inname van het product ten minste 2 uur wordt uitgesteld vanaf de toediening van oraal ingenomen geneesmiddelen of andere producten of voedingssupplementen. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt, als u andere behandelingen krijgt.

7. Bewaren

Bewaar dit product op een droge plaats bij een

temperatuur tussen 15 °C en 25 °C en uit de buurt van directe warmtebronnen of lichtbronnen. Open het zakje pas op het moment van gebruik. Niet gebruiken als de zakjes beschadigd zijn. Buiten het bereik van kinderen houden.

8. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Om een goede gezondheid te behouden, inclusief een gezonde darm, wordt aanbevolen om een geschikt dieet te volgen en voldoende hoeveelheden vloeistoffen te drinken (over het algemeen 2 tot 2,5 liter per dag).

Voordat dit product bij kinderen wordt gebruikt, is het raadzaam om advies van een arts in te winnen.

Simeticon kan de werking verstoren van sommige reagentia die bij diagnostiek worden gebruikt, zoals guaiacgom.

9. Houdbaarheidsdatum

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld. De uiterste houdbaarheidsdatum heeft betrekking op het product wanneer het in de intacte verpakking wordt bewaard.

10. Verwijdering

Verlopen producten worden beheerd volgens de afvalverwerkingsvoorschriften van uw land. Gelieve geen afval achter te laten en de verpakking van dit product op een verantwoorde manier weg te gooien.

MoviGo Duo, Norgine en het zeil logo zijn handelsmerken van de Norgine bedrijvengroep.



Norgine logo



Laatste revisie: mm/jjjj



SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italië



Norgine Pharma B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland

Norgine NV
Philipssite 5 bus 1
3001 Heverlee, België

